

## Xavier Bosch

Director del grupo de epidemiología del Institut Català d'Oncologia, participó ayer en una jornada sobre el virus del papiloma humano organizada por la Clínica Rotger, un acto en el que alertó de que este agente está detrás no solo del cáncer de cérvix, sino también del de pene, de vulva, de vagina y de tumores de la cavidad bucal

# “Habría que vacunar contra el papiloma a niñas y niños desde los 11 a los 26 años”

I. Olaizola  
PALMA



■ El doctor Xavier Bosch, director del grupo de epidemiología del Institut Català d'Oncologia, alertó ayer de que el virus del papiloma humano, asociado fundamentalmente al desarrollo del cáncer de cuello de útero, es también causante de los tumores de vulva, vagina, del canal anal tanto entre hombres como mujeres, del cáncer de pene y de los tumores de la cavidad bucal. Y el especialista recordó que este virus se transmite casi exclusivamente a través de las relaciones sexuales.

“Y como prevención, con mayúsculas, solo cabe vacunarse contra el virus del papiloma humano, porque la vacuna no solo preserva a la persona que se la pone sino que toda la cohorte de individuos inmunizados actúan como barrera e impiden que el virus se propague de forma más efectiva por la sociedad”, explicó el especialista, para quien debería vacunarse a todos las niñas y niños del país con edades comprendidas entre los 11 y los 26 años.

El doctor Bosch realizó estas consideraciones en el transcurso de una jornada sobre el virus del papiloma humano organizada por la Clínica Rotger, un cóncave en el que participaron destacados especialistas como el doctor Javier Cortés o Jack Cuzick, de la Universidad Queen Mary de Londres, entre otras autoridades sobre la materia.

Sobre si el coste de la medida que propone –ampliar el espectro poblacional que debe ser inmunizado contra este virus– es asumible en estos momentos de crisis económica y recortes en sanidad, el doctor Bosch señaló que en Australia se ha adoptado esta medida que ha con-



El doctor Xavier Bosch, durante su conferencia de ayer tarde en la Clínica Rotger. MANU MIELNIEZUK

seguido que en un corto espacio de entre tres y cuatro años hayan prácticamente desaparecido las verrugas genitales también asociadas a este virus y causantes de muchas molestias entre la población sexualmente activa.

### Cinco por ciento de los cáncers

Y volviendo a si esta ampliación del segmento poblacional que debe ser preservado sería una medida coste efectiva en unos momentos en que este es el principal argumento que lleva a decantarse por una u otra política sanitaria, el especialista matizó que todo dependerá del coste de las vacunas que las diferentes administraciones negocien con las multinacionales farmacéuticas.

“Los tumores provocados por el

virus del papiloma humano cada año serán alrededor del 5% o el 6% de todos los tipos de cáncer. Se diagnosticarán unos 600.000 casos cada año en todo el mundo”, esgrimió como argumento para ampliar el segmento poblacional que debe ser vacunado al tiempo que recalca que este virus también está detrás de alrededor de seis millones de lesiones preneoplásicas (precancerígenas) anuales.

Durante la presentación de la jornada, el doctor Javier Garau, de la Clínica Rotger, recordó que cada año se diagnostican 12,7 millones de casos de cáncer en todo el mundo y que, de ellos, dos son atribuibles a infecciones. A continuación señaló que se ha demostrado que hay 11 agentes infec-

de los que siete son virus, uno es una bacteria que está detrás de los tumores gástricos y los tres restantes son parásitos “capaces de producir cáncer allí donde anidan”.

También advirtió de que los virus de la hepatitis B y C, de gran prevalencia en Baleares, “también provocan carcinomas”. Por ello, como su colega catalán, abogó por vacunarse para prevenir una infección por este virus y acabar desarrollando un cáncer genital.

En el transcurso de su disertación, que versó sobre la epidemiología del virus del papiloma en España, el doctor Xavier Bosch echó mano de estadísticas que hablan de que en Europa, entre un 11% y un 12% de mujeres con citologías normales, padecen una infección de alto riesgo por este virus sin sa-

### “Los tumores causados

por este virus suponen entre el 5% y el 6% de todos los tipos de cáncer”

### “Cada año este agente

provoca 848 fallecimientos en toda España y se diagnostican otros 2.500”

berlo. Este porcentaje se reduce en el caso de España al 9% pero en países de África y el Caribe se eleva hasta el 35%, porcentajes similares a los que también se registran en naciones de la Europa del Este.

Dentro de España, Baleares es la tercera comunidad autónoma del país con un mayor porcentaje de infecciones de alto riesgo en pacientes a las que la prueba consistente en analizar una pequeña muestra de tejido del cuello del útero no arrojó inicialmente resultados negativos.

### Circulación universal

El doctor Bosch advirtió de que la “circulación del virus del papiloma va a ser universal entre la generación actual” por la relajación de las costumbres sexuales vigentes. Así, volvió a recurrir a datos y habló de que cada año se pueden diagnosticar cerca de un 1,6 millones de casos de mujeres con infecciones de alto riesgo por este virus y que en un diez por ciento de ellas desarrollarán un cáncer de cuello de útero.

En España, dijo, se registran 7,8 casos de este tipo de tumores genitales por cada cien mil habitantes y la mortalidad crece significativamente entre las mujeres mayores de 65 años como consecuencia de que a partir de esa edad dejan de ser vistas por los especialistas y apartadas de los programas de cribaje y prevención contra el cáncer de cérvix.

“Cada año este virus provoca 848 fallecimientos en todo el país y se diagnostican un total de 2.511 casos de tumores invasores”, concluyó el doctor Bosch su enumeración de datos antes de concluir recordando que las verrugas genitales, patología asociada al papiloma que consume muchos recursos sanitarios y genera gran malestar entre la población, afecta en estos momentos a unas sesenta mil personas en todo el país.